コード No.18501

Anti-Human
TPO Rabbit IgG Affinity Purify

容量 : 100 µg

TPO : Thorombopoietin

はじめに : 巨核球系細胞に特異的に作用するトロンボポエチンは、その受容体遺伝子 *c-mpl* がクローニングされたことにより、その遺伝子がクローニングされました。

免疫抗原 : Human TPO の N 端部分合成ペプチド

精製方法 : 抗原ペプチドによる特異精製

包装形態 : 1 % BSA、0.05 % NaN_3 含有 PBS 1.0 mL に溶解したものを凍結乾燥

再生方法 : 精製水 1.0 mL 添加 (この時濃度は 100 µg/mL となります)

保存方法及び安定性 : 2 ～ 8 °C 保存 5 年間安定
: 溶解後 –20 °C 保存 2 年間安定

使用目的及び使用方法 : 免疫組織染色 1～5 µg/mL にて使用可能 (ホルマリン固定･パラフィン包埋切片)
ウエスタン･ブロッティング 2～5 µg/mL にて使用可能 (18.5 kDa)

特異性 : Human EPO, Human G-CSF と非交差

株式会社 免疫生物研究所
〒375-0005 群馬県藤岡市中 1091-1
電話：0274-22-2889 FAX：0274-23-6055
E-mail: do-ibl@ibl-japan.co.jp
URL: http://www.ibl-japan.co.jp